Протокол итогов по объявлению №2

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 11 часов 00 минут, 25 января 2024 года

1. Основание: пункт 77 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».
2. Организатор государственных закупок – КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Держинского, 9, административный корпус, экономический отдел, провел закуп способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№ лота	Наименование товара	Характеристика товара	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1.	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х60мл+8х15мл	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксоглютарат/L-аланин, кинетика, жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности 500 Ед/л = 4.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78 960,00	473760,00
2.	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х20мл	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимическо-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе Панкреатический профиль; этилидена блокированный субстрат, кинетика: жидкий монореагент. Состав: Реагент A. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий эвциаинат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	34	214 085,00	7278890,00
3.	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х60мл+8х15мл	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксоглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л,лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л Пределы линейности 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78 960,00	473760,00
4.	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х60мл+8х15мл	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диносульфиновая кислота, конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Соляная кислота 170 ммоль/л, цитрата 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент B. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологическое характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 ммоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 ммоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%. Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 ммоль/л. Повторность (CV) 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	14	47 303,00	662270,00
5.	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диносульфиновая кислота/бензоат натрия, конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, динатриевая этилендиаминоуксусная кислота (EDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент B. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09	28	28 275,00	791700,00

	закрытого типа(300мл)	мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований - 900, фасовка 4 х 60 мл + 4 х 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
6.	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 16х60 мл	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкоокидаза, конечная точка, жидкий биореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкоокисидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 100 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV): 1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	5	21 880,00	109400,00
7.	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 4х60мл+4х15мл	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика; жидкий биореагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4х 60 мл + 4х 15 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	10	89 125,00	891250,00
8.	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа (2х60 + 2х15)	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; ферроцин, конечная точка; жидкий биореагент. Состав реагента: Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В. Ферозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности: 1000 мг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2х 60 +2х15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	45 800,00	91600,00
9.	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 10х60мл	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемии, почечный профиль; гидрокарбонат магния/ферроцин, дифференциальный режим; жидкий биореагент. Состав реагента: Трис 215 ммоль/л, гидрокарбонат натрия 84 ммоль/л, железо (II) сульфат 36 ммоль/л, pH 8.4. Реагент В. Ферозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Предел обнаружения 23.6 мг/дл НЖС = 3.4 мкмоль/л НЖС.Предел линейности: 700 мг/дл НЖС = 125 мкмоль/л НЖС. Повторяемость: Средняя НЖС концентрация: 174 мг/дл = 31.2 мкмоль/л. CV:2,1%. n: 20%. Средняя концентрация 280 мг/дл = 50.1 мкмоль/л. CV:1,5%. n: 20%.Воспроизводимость: Средняя НЖС концентрация: 174 мг/дл = 31.2 мкмоль/л. CV: 2.8 %. n: 25. Средняя НЖС концентрация: 280 мг/дл = 50.1 мкмоль/л. CV: 2.4 %. n: 25. Количество исследований-450. Фасовка 2х 60 +2х15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	63 280,00	126560,00
10.	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл (10х60мл)	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, щелочный пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	8	40 205,00	321640,00
11.	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреазы/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глюкозодегидрогеназа > 140 Ед/мл, этилендиаминотетраацетат 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологической характеристики: Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя	10	88 160,00	881600,00

		концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 % Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
12.	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа, 160мл	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие барокода на каждом флаконе. Общий сывороточный профиль, бауреовый реакция, конечная точка, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, медь (II) ацетат 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.5 %, Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV)-0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	45	10 850,00	488250,00
13.	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 5x5мл	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фосфор, 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59 140,00	591400,00
14.	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59 140,00	591400,00
15.	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, α-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59 140,00	591400,00
16.	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400	Реакционный ротор из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакриловый термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 5 мм, 10 штук в упаковке. Роторы должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	50 465,00	504650,00
17.	Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. Испания,1000 штук в упаковке	24	37 330,00	895920,00
18.	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x15 мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	36 660,00	146640,00
19.	Флакон с кислотным промывочным раствором из комплекта Анализатор биохимический-	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (4x20мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	38 500,00	154000,00

	турбидиметрический BA400				
20.	HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x20мл)	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие бирки на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, ингибитор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, ферментативная оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 20 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	7	331 525,00	2320675,00
21.	LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 2x60мл+2x20мл	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, необходимо наличие бирки на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, ингибитор оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л пероксидаза >1 Ед/мл, детергент; pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, pH 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	14	243 155,00	3404170,00
22.	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 10x60мл	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие бирки на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицерол/фосфоноксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицерокиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл. 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.167 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) - 1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.6 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	196 705,00	590115,00
23.	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Концентрированный промывочный раствор для автоматического биохимического анализатора BA400, 500 мл, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210	15	95 630,00	1434450,00
24.	ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА ДЭА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 4x60мл, 4x15мл	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие бирки на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV)0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.7 %. Средняя концентрация: 553 ЕД/Л = 5.85 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	102 800,00	411200,00
25.	Липаза из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1x20+1x10 мл	ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие бирки на каждом флаконе. Панкреатический профиль; кинетический метод, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Бицинновый буфер 50 ммоль/л, ксилиназа ≥ 1 мг/л, дезоксихолат 1.6 ммоль/л, хлорид кальция 10 ммоль/л, pH 8.0. Реагент В. Тартратный буфер 10 ммоль/л, 1,2-О-дилаурил-рац-глицерин-3-глутаровая кислота-(6-метилрезоруфин)-эфир ≥ 0.3 ммоль/л, таурохенодезоксихолат 8.0 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики: Предел обнаружения: 4.89ед./л = 0.08 мккат/л. . Предел квантификации: 8.52 ед./л = 0.14мккат/л. Предел линейности: 250 ед./л = 4.17 мккат/л. Для более высоких значений разбавьте образец на 1/2 дистиллированной водой и повторите измерение. Диапазон измерения: (8.52 ед./л = 0.14 мккат/л) - (250 ед./л = 4.17 мккат/л). Точность: Средняя концентрация:52.1 ед./л = 0.86 мккат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.1 %. Средняя концентрация: 67.2 ед./л = 1.11 мккат/л. Повторность (CV): 2.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация 122 ед./л = 2.03 мккат/л.Повторность (CV): 1.6 %.	25	130 100,00	3252500,00

		Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Количество исследований-90. Фасовка 1х20мл+1х10мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.			
26.	Лактатдегидрогеназа из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 8х60мл+8х15мл	ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л pH 7.2. Реагент В. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторность (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 860 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторность (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	1	96 165,00	96165,00
27.	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1х60 + 1х15)	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %. Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1х60мл+1х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	24	66 715,00	1601160,00
28.	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1мл	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка 1мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	19 235,00	115410,00
29.	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 3х1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33 580,00	302220,00
30.	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 3х1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33 580,00	302220,00
31.	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA 400 закрытого типа 10х60мл	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). PK-MT-5N021111, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	75 430,00	226290,00
32.	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 ммоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 ммоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 ммоль/л. Повторность	1	85 375,00	170750,00

		(CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x66мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
33.	Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности.Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	84	53 000,00	4452000,00
34.	Промывочный реагент Cleanac (Cleanac): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов.Активный компонент: полиоксиэтиленгидрированный эфир. Фасовка: бутыль - 5 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	13	44 100,00	573300,00
35.	Лизирующий реагент Hemolynac 3N (Hemolynac 3N): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли, состав 27,0 г/л. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором MEK6510 закрытого типа. Для двухкомплектации анализатора МЕК закрытого типа. Обязательное наличие у Поставщика авторизационного письма от производителя."	24	66 150,00	1587600,00
36.	Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для жесткой очистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированных на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	15	28 000,00	420000,00
37.	Трубка для насоса: совместима с анализатором МЕК закрытого типа	Трубочка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из эластомера длиной 12 см с фиксирующими кольцами на концах. Трубочка предназначена для перемещения растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	4	72 450,00	289800,00
38.	Фильтр: совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа.	4	6 100,00	24400,00
39.	Контрольная кровь гематология MEK 3DL HEMATOLOGY CONTROLS LOW (низкий), MEK 3DN HEMATOLOGY CONTROLS NORMAL (нормальный), MEK 3DH HEMATOLOGY CONTROLS HIGH (высокий): совместимы с анализатором МЕК закрытого типа	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 5 субпопуляции. Фасовка: 3*2ml (1L,1N,1H). Совместим с анализатором МЕК закрытого типа.	8	105 300,00	842400,00
40.	Набор для определения АНТВ	Набор для определения АНТВ на 100 определений	27	12 500,00	337500,00
41.	Реактивастин МНЧ	В упаковке флакон 10 шт.	40	54 900,00	2196000,00
42.	Набор реагентов «RPR-Carbon-Daco для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR - кардиолипиновым антигеном	1000 определений	10	19 520,00	195200,00
43.	Набор красителей по Граму	Набор с фуксином Циля на 100 определений с выявлением принадлежности грам + и грам -	8	6 000,00	48000,00

44.	Азур-эозин по Романовскому	1 литр	1	6 000,00	6000,00
45.	Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9394 - 011-29508133-2009	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный показателю стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл.	10	770,00	7700,00
46.	Шприц для забора крови	Шприц с разъемом Luer Ca2+LH 30 I.U. 3 мл 100 шт в упаковке	60	55 000,00	3300000,00
47.	Картридж с IQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3G.5K BG/ISE/GL 300 TEST IQM PAK	Быстро заменяемый блок с реагентами и электродами для Анализатора газов крови и электролитов GEM Premier 3000: • Габариты 216x76x152 мм. Вес 1,9 кгЕмкость: 300 тестов – 21 день на борту/Объем образца: 135 мкл (газы крови, электролиты, гематокрит); газы крови/электролиты/глюкоза/лактат/гематокрит 145 мкл при капиллярном режиме, 150 мкл при обычном Тип образца – Цельная гепаринизированная кровь	9	817 100,00	7353900,00
48.	Реагент контроля качества GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3500	Реагент контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000. Реагенты контроля качества для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20 ампул в упаковке	4	127 375,00	509500,00
49.	Тест-полоски Dirui H13-Cr	Тест полоски для анализатора Dirui H13-Cr дающие развернутый анализ мочи по 13 показателям: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, pH и количественным выражении, цвет и мутность образца, аскорбиновая кислота; а также по 2 расчетным показателям: цвет и прозрачность.	200	14 157,00	2831400,00
50.	Контроль мочи (отрицательный) Urinalysis Control (Negative)	8мл /бутылка	10	3 485,00	34850,00
51.	Контроль мочи (положительный) Urinalysis Control (Positive)	8мл /бутылка	10	3 485,00	34850,00
52.	Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов	Набор реагентов и принадлежностей для количественного экспресс определения Тропонин-I в сыворотке/плазме человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания образца с буфером для детекции; флакон с буфером; картридж. Количество тестов в наборе - 25.	60	77 000,00	4620000,00
53.	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I для портативного флуоресцентного анализатора i-CHROMA II	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I на анализаторе i-CHROMA II	4	28 750,00	115000,00
54.	Реагент А калибровочный/A calibration reagent Audicom AC9811	Реагент А калибровочный/A calibration reagent	100	62 000,00	6200000,00
55.	Реагент В стандартный/B standart reagent Audicom AC9801	Реагент В калибровочный/A calibration reagent	15	53 000,00	795000,00

56.	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent Audicom AC9801	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent	15	31 000,00	465000,00
57.	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent Audicom AC9801	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent	15	31 000,00	465000,00
58.	Трубка насоса Audicom AC9801	Упаковка 1 шт	3	35 000,00	105000,00
59.	Быстрый количественный тест на Ферритин (Ferritin)	Для анализатор FIA BIOT-YG-I. Набор 25 тестов	60	60 000,00	3600000,00
60.	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин)	Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин) Biotime-YG-I Набор 25 тестов в наборе	24	41 000,00	984000,00
61.	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест на D-Dimer (д.димер)	Быстрый количественный тест D-Dimer (д.димер) Biotime-YG-I 25 тестов в наборе	120	60 000,00	7200000,00
62.	Быстрый количественный тест на прокальцитонин для анализатора FIA BIOT-YG-I	Набор реактивов 25 тестов	50	63 000,00	3150000,00
63.	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест PSA	Быстрый количественный тест PSA (общий) Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (общий) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детекторования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт / Комплект	1	63 000,00	63000,00
64.	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест fPSA	Быстрый количественный тест PSA (свободный) Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (свободный) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детекторования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект	1	63 000,00	63000,00
65.	Biotime-YG-I NT-pro BNP быстрый количественный тест	Набор реактивов 25 тестов	15	75 000,00	1125000,00
66.	Наконечники для одноканального механического дозатора	объемом 50-200 мкл. Упаковка 1000 шт	45	5 000,00	225000,00
67.	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60мл+1x15мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие бренда на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль, латексагглютинин/гаммаглобулин, фиксированное время, жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, пмл натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Порогова чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 %. Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	5	66 715,00	333575,00

68.	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x3 мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x3 мл	5	20 465,00	102325,00
69.	MAGLUMI HBsAg (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный комплект реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. В состав набора входит: магнитные микрочастицы, покрытые моноклональными антителами к антигену гепатита В, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %)-2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; буфер, содержащий БСА и NaN3 (<0,1 %)-12,5 мл; поликлональные антитела к антигену HBs вируса гепатита В, меченые ABEI, в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)-22,5 мл; внутренний контроль качества, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)- 2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. Набор на 100 исследований. температура хранения 2-8°C. Специфичность анализа HBsAg не менее 99,96 %.	80	91 540,00	7323200,00
70.	MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный набор реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови или плазме человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. Набор содержит: магнитные микрочастицы, покрытые стрептавидином, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %) – 2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; биотинилированные антигены и антиген к клру HCV+NS3+NS4+NS5, меченый ФИТЦ, в буфере, содержащем NaN3 (<0,1 %)-7,5 мл; поликлональные антитела к антигену меченые ABEI, в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)- 12,5 мл; внутренний негативный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)- 2,0 мл; внутренний позитивный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. На 100 исследований. температура хранения 2-8°C. Аналитическая чувствительность <2 УЕ/мл.	50	137 300,00	6865000,00
71.	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реактивов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEI., которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	25	41500,00	1037500,00
72.	Промывочный концентрат 1 X 0.714 л из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания кювет и дозирующих игл.	35	22280,00	779800,00
73.	Реакционные модули из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI X3 (кюветы 3x182 шт)	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI представлен упаковкой кювет для проведения реакции 3x182 кюветы.	37	33150,00	1226550,00
74.	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл.	2	36610,00	109830,00
75.	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Очищающий раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI используется для очистки трубок анализатора и предотвращения переноса реагентов при приготовлении реакционных смесей. Объем 500 мл.	1	95200,00	95200,00
					102 387 275,00

3.По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

1) В 12:03, 22.01.2024 года ТОО «InNext» г.Астана, район Есиль, ул.Турара Рыскулова, дом 5/2, офис 44

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
33	Изотонический раствор Isoonac 4 (Ысоонас 4): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности.Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	84	53 000,00	4452000,00
34	Промывающий реагент Cleanac (Cleanac): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на мембранах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов.Активный компонент: полиоксиэтиленгидрированный эфир. Фасовка: бутыль - 5 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	13	44 100,00	573300,00
35	Лизирующий реагент Hemolynac 3N (Hemolynac 3N): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли, состав 27,0 г/л. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором МЕК6510 закрытого типа. Для документации анализатора МЕК закрытого типа. Обязательное наличие у Поставщика авторизационного письма от производителя.*	24	66 150,00	1587600,00
36	Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для жесткой очистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	15	28 000,00	420000,00
37	Трубка для насоса: совместима с анализатором МЕК закрытого типа	Трубочка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из тефлона длиной 12 см с фиксирующими кольцами на концах. Трубочка предназначена для перекачивания растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	4	72 450,00	289800,00
38	Фильтр: совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа.	4	6 100,00	24400,00
39	Контрольная кровь гематологии MEK 3DL HEMATOLOGY CONTROLS LOW (низкий), MEK 3DN HEMATOLOGY CONTROLS NORMAL (нормальный), MEK 3DH HEMATOLOGY CONTROLS HIGH (высокий): совместима с анализатором МЕК закрытого типа	Суспензии с взвешенными формменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 5 субпопуляции. Фасовка: 3*2ml (1L,1N,1H). Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	8	105 300,00	842400,00
				Итого:	8 189 600,00

3.По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

2) В 09:15, 22.01.2024 года ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Эстихан Бокейхан, микрорайон 19, строение 40А

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
45	Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 - 011-29508133-2009	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объективов свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому	10	750,00	7500,00

		стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл.			
66	Наконечники для одноканального механического дозатора	объёмом 50-200 мкл. Упаковка 1000 шт	45	1630,00	73350,00
				Итого	80 850,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

3) В 10:19, 23.01.2024 года ТОО «БурАН 8» г.Костанай, ул.Кирбишева, 11, кв.20					
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	11500,00	310500,00
41	Реомиелитин МВЧ	В упаковке должен 10 шт .	40	44500,00	1780000,00
42	Набор реагентов «RPR-Carbon-Quick для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR - кардиолипиновым антигеном	1000 определений	10	17200,00	172000,00
43	Набор красителей по Граму	Набор с фуксином Циля на 100 определений с выявлением принадлежности грамм + и грамм -	8	5400,00	43200,00
44	Азур-эозин по Романовскому	1 литр	1	5100,00	5100,00
45	Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 - 011-29508133-2009	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный такому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл.	1	7300,00	7300,00
				Итого	2 318 100,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

4) В 15:10, 23.01.2024 года ТОО «Nobilis SA» г.Астана, пр.Сарыарка 31/2, БЦ «ЗАПАД 2», 8 этаж, 4 офис					
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
46	Шприц для забора крови	Шприц с раствором Luer Ca2+ LH 30 I.U. 3 мл 100 шт в упаковке	60	30000,00	1800000,00
59	Быстрый количественный тест на Ферритин (Ferritin)	Для анализатора FIA BIOT-YG-I. Набор 25 тестов	60	60000,00	3600000,00
60	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин)	Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин) Biotime-YG-I Набор 25 тестов в наборе	24	41000,00	984000,00
61	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест на D-Dimer (д димер)	Быстрый количественный тест D-Dimer (д димер) Biotime-YG-I 25 тестов в наборе	120	60000,00	7200000,00

62	Быстрый количественный тест на проальцитонин для анализатора FIA BIOT-YG-I	Набор реактивов 25 тестов	50	63000,00	3150000,00
63	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест PSA	Быстрый количественный тест PSA (общий). Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (общий) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детектирования 25 проберок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект	1	63000,00	63000,00
64	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест fPSA	Быстрый количественный тест PSA (свободный). Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (свободный) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детектирования 25 проберок / набор. 3. SD-карта 1 шт / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект	1	63000,00	63000,00
65	Biotime-YG-I NT-pro BNP быстрый количественный тест	Набор реактивов 25 тестов	15	75000,00	1125000,00
				Итого	17 988 000,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

5) В 14:18, 24.01.2024 года ТОО «ЛабВесТех» г.Костанай, Боровина, 196

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
44	Азур-эозин по Романовскому	1 литр	1	4800,00	4800,00
45	Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 - 011-29508133-2009	Используют в качестве необходимого вспомогательного реагента в системой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл.	10	724,00	7240,00
66	Наконечники для одноканального механического дозатора	объёмом 50-200 мкл. Упаковка 1000 шт	45	2912,00	131040,00
				Итого	143 120,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

6) В 14:18, 24.01.2024 года ТОО «Трансмедсервис» г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 191

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	11750,00	317250,00
41	Ренамиластин МНЧ	В упаковке флакон 10 мл.	40	32330,00	1293200,00
42	Набор реагентов «RPR-Carbon-Диа» для обнаружения	1000 определений	10	12325,00	123250,00

	сифилиса методом агглютинации с RPR - кардиолипиновым антигеном				
				Итого	1 733 700,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

7) В 15:00, 24.01.2024 года ТОО «Invitro» г.Костанай, ул.Маяковского 35

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	9800,00	264600,00
41	Ренамиластин МНН	В упаковке флакон 10 шт .	40	40500,00	1620000,00
				Итого	1 884 600,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

8) В 18:15, 24.01.2024 года ТОО «ONTUSTIK MEDICAL» г.Шымкент, ул.Майлы Кожа, здание 203

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
49	Тест-полоски Dirui H13-Cr	Тест полоски для анализатора Dirui H13-Cr дающие развернутый анализ мочи по 13 показателям: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, pH в полуколичественном выражении, цвет и мутность образца, аскорбиновая кислота; а также по 2 расчетным показателям: цвет и прозрачность.	200	14157,00	2831400,00
50	Контроль мочи (отрицательный) Urinalysis Control (Negative)	8мл /бутылка	10	3485,00	34850,00
51	Контроль мочи (положительный) Urinalysis Control (Positive)	8мл /бутылка	10	3485,00	34850,00
				Итого	2 901 100,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

9) В 16:10, 24.01.2024 года ТОО «Современные медицинские технологии» г.Костанай, ул.Пушкинская, д.126, офис 27

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
1	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8x60мл+8x15мл	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль: 2-оксоглутарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.5. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) - 1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78960,00	473760,00

2	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х20мл	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№01221Н; наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/л. = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	34	214085,00	7278890,00
3	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х60мл+8х15мл	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аспартат, кинетика; жидкий сиреагент. Состав реагента: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>461 Ед/л,лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78960,00	473760,00
4	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8х60мл+8х15мл	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диаксульфаниловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3,61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	14	47305,00	662270,00
5	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа(300мл)	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфаниловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав. Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.68 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований - 900, фасовка 4 х 69 мл + 4 х 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	28	28275,00	791700,00
6	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 10х60 мл	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.91 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	5	21880,00	109400,00
7	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; кэпсидилидин, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент Б. γ-Глутамил-3-карбокси 4-нитроанилид 32.5 ммоль/л	10	89125,00	891250,00

	турбидиметрический BA400 закрытого типа 4x60мл+4x15мл	Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторяемость (CV) - 2.3 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторяемость (CV) 0.6%; Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4x 60 мл + 4x 15 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.			
8	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа (2x60 + 2x15)	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий, ферроэн, конечная точка; жидкий биреагент. Состав реагента: Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Ферроэн 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторяемость(CV) 1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 ммоль/л. Повторяемость(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2x 60 +2x15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	45800,00	91600,00
9	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 10x60мл	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Диагностика анемий, печеночный профиль; гидрокарбонат магния/ферроэн, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 215 ммоль/л, гидрокарбонат натрия 84 ммоль/л, железо (II) сульфат 36 µмоль/л, pH 8.4. Реагент B. Ферроэн 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Предел обнаружения 23.6 µг/дл НЖС = 3.4 µмоль/л НЖС.Предел линейности: 700 µг/дл НЖС = 125 µмоль/л НЖС. Повторяемость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV:2,1%. n: 20%. Средняя концентрация:280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV:1,5%. n: 20%.Воспроизводимость: Средняя НЖС концентрация: 174 µг/дл = 31.2 µмоль/л. CV: 2.8 %. n: 25. Средняя НЖС концентрация: 280 µг/дл = 50.1 µмоль/л. CV: 2.4 %. n: 25. Количество исследований-450. Фасовка 2x 60 +2x15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	63280,00	126560,00
10	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл (10x60мл)	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5x60мл+5x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	8	40205,00	321640,00
11	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутамат дегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 1.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глутамат дегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристика: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторяемость (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторяемость (CV): 3.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторяемость (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	88160,00	881600,00
12	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа, 160мл	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7N012210, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент B. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел	45	10850,00	488250,00

		линейности-150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %. Общая воспроизводимость (CV)- 1.6 %. Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая воспроизводимость (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
13	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 5х5мл	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
14	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
15	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
16	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400	Реакционный ротор из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. Роторы должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	50465,00	504650,00
17	Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке	24	37330,00	895920,00
18	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4х15 мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	36660,00	146640,00
19	Флакон с кислотным промывочным раствором из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (4х20мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	38500,00	154000,00
20	HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4х60мл+4х20мл)	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Туда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, ингибитор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Туда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.18 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4 х 60 мл + 4 х 20 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	7	331525,00	2320675,00

21	LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 2x6мл+2x20мл	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, пероксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент; pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,N'bis(4-сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент; pH 6.3. Метрологические характеристики: Порговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %, 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	14	243155.00	3404170.00
22	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 10x60мл	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Общий липидный профиль; глицерофосфаноксидаза/пероксидаза конечная точка; жидкий хомореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицерокиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфаноксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Порговая чувствительность: Порговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %, Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	198705.00	596115.00
23	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Концентрированный промывочный раствор для автоматического биохимического анализатора BA400, 500 мл, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210	15	95630.00	1434450.00
24	ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА ДЭА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 4x60мл, 4x15мл	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Порговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.7 %. Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	102800.00	411200.00
25	Липаза из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1x20+1x10 мл	ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Панреатический профиль; дистой метод, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Бициновый буфер 50 ммоль/л, колиназа ≥ 1 мг/л, дезоксихолат 1.6 ммоль/л, хлорид кальция 10 ммоль/л, pH 8.0. Реагент В. Тартратный буфер 10 ммоль/л, 1,2-О-дилаурил-рац-глицерин-3-глутаровая кислота-(6'-метилресорфин)-эфир ≥ 0.3 ммоль/л, тауродезоксихолат 8.0 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики: Предел обнаружения: 4.89 ед./л = 0.08 мккат/л. . Предел квантификации: 8.52 ед./л = 0.14мккат/л. Предел линейности: 250 ед./л = 4.17 мккат/л. Для более высоких значений разбавьте образец на 1/2 дистиллированной водой и повторите измерение. Диапазон измерения: (8.52 ед./л = 0.14 мккат/л) - (250 ед./л = 4.17 мккат/л).Точность: Средняя концентрация 52.1 ед./л = 0.86 мккат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.1 %. Средняя концентрация: 67.2 ед./л = 1.11 мккат/л. Повторность (CV): 2.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:122 ед./л = 2.03 мккат/л.Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Количество исследований-90. Фасовка 1x20мл+1x10мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	25	130100,00	3252500,00
26	Лактатдегидрогеназа из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 8x60мл+8x15мл	ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). Сердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л,pH 7.2. Реагент В. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Порговая чувствительность: 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторность (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 861 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторность (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800.	1	96165.00	96165,00

		Фасовка 8х60мл+8х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
27	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический+ турбидиметрический BA400 (1х60 + 1х15)	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; антиген/антитела/иммунитет к СРБ, фиксированное время; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 %. Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1х60мл+1х15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	24	66715,00	1601160,00
28	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1мл	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка 1мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	19235,00	115410,00
29	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 3х1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33580,00	302220,00
30	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 3х1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33580,00	302220,00
31	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA 400 закрытого типа 10х60мл	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), PK-MT-SN021111, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, хлор натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.6. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл. температура хранения +2 +8°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	75430,00	226290,00
32	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	85375,00	170750,00
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	12195,00	329265,00
47	Картридж с ЮМ для исследования газов крови/гематокрита/электролито	Быстро заменяемый блок с реагентами и электродами для Анализатора газов крови и электролитов GEM Premier 3000: + Габариты 216x76x152 мм, Вес 1,9 кгЕмкость: 300 тестов - 21 день на борту.Объем образца: 125 мкл (газы крови, электролиты, гемокрит), газы крови/электролиты/глюкоза/лактат/гематокрит: 145 мкл при капиллярном режиме, 150	9	817100,00	7353900,00

	в/лактат/глюкоза GEM 3/3.5K BG/SE/GL 300 TEST IQM PAK	мкл при обычном Тип образца – Цельная гепаринизированная кровь.			
48	Реагент контроля качества GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3500	Реагент контроля качества: GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000. Реагенты контроля качества: для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20 ампул в упаковке	4	127375,00	509500,00
52	Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов	Набор реагентов и принадлежностей для количественного экспресс определения Тропонин-I в сыворотке/плазме человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания образца с буфером для детекции; флакон с буфером; картридж. Количество тестов в наборе - 25.	60	77000,00	4620000,00
53	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I для портативного флуоресцентного анализатора i-CHROMA II	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I на анализаторе i-CHROMA II	4	28750,00	115000,00
67	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60мл+1x15мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический – турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль, латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время, жидкий реагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческим гамма-глобулином,азид натрия 0,95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1,4 %, Внутрилабораторный показатель (CV) - 3.7 %. Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0,7 %. Общая погрешность (CV)- 1,9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	5	66715,00	333575,00
68	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x3 мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x3 мл	5	20465,00	102325,00
69	MAGLUMI HBsAg (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный комплект реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. В состав набора входит: магнитные микрочастицы, покрытые моноклональными антителами к антигену гепатита В, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %)-2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; , калибратор высокой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; буфер, содержащий БСА и NaN3 (<0,1 %)-12,5 мл; поликлональные антитела к антигену HBs вируса гепатита В, меченые ABEI; в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)-22,5 мл; внутренний контроль качества, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)- 2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. Набор на 100 исследований, температура хранения 2-8°C. Специфичность анализа HBsAg не менее 99,96 %	80	91540,00	7323200,00
70	MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный набор реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови или плазме человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. Набор содержит: магнитные микрочастицы, покрытые стрептавидином, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %) – 2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С в NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С в NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; биотинилированные антигены и антиген к вирусу HCV+NS3+NS4+NS5, меченый ФИТЦ, в буфере, содержащем NaN3 (<0,1 %)-7,5 мл; поликлональные антитела к антигену меченые ABEI; в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)- 12,5 мл; внутренний негативный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл, внутренний позитивный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и	50	137300,00	6865000,00

		NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. На 100 исследований. температура хранения 2-8°С. Аналитическая чувствительность <2 УЕ/мл.			
71	Стартовые реагенты 1+2 из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	25	41500,00	1037500,00
72	Промывочный концентрат 1 х 0,714 л из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания ковет и дозирующих игл.	35	22280,00	779800,00
73	Реакционные модули из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI X3 (кюветы 3х182 шт)	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI представлен упаковками кювет для проведения реакции 3х182 кюветы.	37	33190,00	1228030,00
74	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл.	3	36610,00	109830,00
75	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Очищающий раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI используется для очистки трубок анализатора и предотвращения переноса реагентов при приготовлении реакционных смесей. Объем 510 мл.	1	95200,00	95200,00
				Итого	61 095 540,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

10) В 08:45, 25.01.2024 года ИП «BMLGMED» г.Шымкент, ул.Майлы Кожа, здание 203

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
66	Наконечники для одноканального механического дозатора	объемом 50-200 мкл. Упаковка 1000 шт	45	2400,00	108000,00
				Итого	108 000,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

11) В 09:15, 25.01.2024 года ТОО «Алматинский Торговый Холдинг» г.Шымкент, Абайский район, квартал 189, дом 32, кв 65

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
52	Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов	Набор реагентов и принадлежностей для количественного экспресс определения Тропонин-I в сыворотке/плазме человека. Состав набора: 1D чип с данными калибровки конкретного лота; пробирки для смешивания образца с буфером для детекции; флакон с буфером; картридж. Количество тестов в наборе - 25.	60	72000,00	4320000,00
53	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I для портативного флуоресцентного анализатора i-CHROMA II	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I на анализаторе i-CHROMA II	4	28745,00	114980,00

54	Реагент А калибровочный/A calibration reagent Audicom AC9801	Реагент А калибровочный/A calibration reagent	100	59000,00	5900000,00
55	Реагент В стандартный/B standart reagent Audicom AC9801	Реагент В калибровочный/A calibration reagent	15	49000,00	735000,00
56	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent Audicom AC9801	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent	15	29900,00	448500,00
57	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent Audicom AC9801	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent	15	29900,00	448500,00
69	MAGLUMI HBsAg (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный комплект реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. В состав набора входит: магнитные микрочастицы, покрытые моноклональными антителами к антигену гепатита В, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %)-2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; , калибратор высокой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; буфер, содержащий БСА и NaN3 (<0,1 %)-12,5 мл; поликлональные антитела к антигену HBs вируса гепатита В, меченые ABEI, в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)-22,5 мл; внутренний контроль качества, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)- 2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. Набор на 100 исследований. температура хранения 2-8°С. Специфичность анализа HBsAg не менее 99,96 %	80	89900,00	7192000,00
70	MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный набор реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови или плазме человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. Набор содержит: магнитные микрочастицы, покрытые стрептавидином, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %) – 2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; биотинилированные антигены и антиген к вирусу HCV+NS3+NS4+NS5, меченый ФИТЦ, в буфере, содержащем NaN3 (<0,1 %)-7,5 мл; поликлональные антитела к антигену меченые ABEI; в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)- 12,5 мл; внутренний негативный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. внутренний позитивный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. На 100 исследований. температура хранения 2-8°С, Аналитическая чувствительность <2 УЕ/мл.	50	130100,00	6505000,00
71	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEI., которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 250 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	25	40000,00	1000000,00
72	Промывочный концентрат 1 х 0.714 л из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания иглы и дозирующих игл.	35	22000,00	770000,00
74	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл	3	36500,00	109500,00
				Итого	**27 543 480,00**

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

12) В 09:25, 25.01.2024 года ТОО «Норд реактив» г.Костанай, ул.Гашека 6/1-28

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	9585,00	258795,00
41	Реагентпластин МИТ	В упаковке флакон 10 шт .	40	40893,00	1635720,00
42	Набор реагентов «RPR-Carbon-Dia» для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR - кардиолипиновым антигеном	1000 определений	10	17366,00	173660,00
				Итого	2 068 175,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

13) В 09:45, 25.01.2024 года ИП «Алтынбеков» г.Астана, ул.Тлендиева 52/2, ВП-84

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
54	Реагент А калибровочный/A calibration reagent Audicom AC9801	Реагент А калибровочный/A calibration reagent	100	62000,00	6200000,00
55	Реагент В стандартный/B standart reagent Audicom AC9801	Реагент В калибровочный/A calibration reagent	15	53000,00	795000,00
56	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent Audicom AC9801	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent	15	31000,00	465000,00
57	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent Audicom AC9801	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent	15	31000,00	465000,00
58	Трубка насос Audicom AC9801	Упаковка 1 шт	3	35000,00	105000,00
				Итого	8 030 000,00

3. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

14) В 09:56, 25.01.2024 года ТОО «FlyMed Group» г.Астана, ул.Ж.Молдагалиев, дом 4, офис 93

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
46	Шприц для забора крови	Шприц с разъемом Luer Ca2+LH 30 I.U. 3 мл 100 шт в упаковке	60	30900,00	1854000,00
				Итого	1 854 000,00

4. **В соответствии с п.78. главы 3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, признать победителем потенциального поставщика, предложившего ценовое** предложение по следующим позициям товаров:

1) В 12:03, 22.01.2024 года ТОО «InNexto» г.Астана, район Есиль, ул.Турара Рыскулова, дом 5/2, офис 44

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
33	Изотонический раствор Isotonac 4 (Isotonac 4): совместим с анализатором МЕК закрытого тип	Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводности и осмолярности.Активный компонент: Хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка: канистра - 20 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	84	53 000,00	4452000,00
34	Промывающий реагент Cleanac (Cleanac): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывания жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, кюветов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов.Активный компонент: полиоксиэтиленгликолевый эфир. Фасовка: бутыль - 5 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	13	44 100,00	573300,00
35	Лизирующий реагент Hemolynac 3N (Hemolynac 3N): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент: Четвертичные аммониевые соли, состав 27,6 г/л. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором МЕК6510 закрытого типа. Для дооснащения анализатора МЕК закрытого типа. Обязательное наличие у Поставщика авторизационного письма от производителя.''	24	66 150,00	1587600,00
36	Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3): совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Раствор (диагностика in vitro) для жесткой очистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора засобированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент: Гипохлорит натрия. Фасовка: бутыль - 1 л. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	15	28 000,00	420000,00
37	Трубка для насоса: совместима с анализатором МЕК закрытого типа	Трубочка перистальтического насоса представляет из себя полую трубочку, изготовленную из силикона длиной 12 см с фиксирующим кольцами на концах. Трубочка предназначена для перекачивания растворов из канистр в анализатор, а также утилизации биоотходов из анализатора в контейнер слива. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	4	72 450,00	289800,00
38	Фильтр: совместим с анализатором МЕК закрытого типа	Фильтр гемоглобина, предназначен для фильтрации от сгустков крови. Совместим с анализатором МЕК закрытого типа.	4	6 100,00	24400,00
39	Контрольная кровь гематология MEK 3DL HEMATOLOGY CONTROLS LOW (низкий), MEK 3DN HEMATOLOGY CONTROLS NORMAL (нормальный), MEK 3DH HEMATOLOGY CONTROLS HIGH (высокий): совместима с анализатором МЕК закрытого типа	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 5 субпопуляции. Фасовка: 3*2ml (1L,1N,1H). Совместим с анализатором МЕК закрытого типа	8	105 300,00	842400,00
				Итого	**8 189 500,00**

2) В 09:15, 23.01.2024 года ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда, район Олихан Бокейхан, микрорайон 19, строение 40А

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
66	Наконечники для одноканального механического дозатора	объемом 50-200 мкл. Упаковка 1000 шт	45	1630,00	73350,00

				Итого	73 350,00

3) В 10:19, 23.01.2024 года ТОО «БурАН 8» г.Косганай, ул.Карбышева, 11, кв.20

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
43	Набор красителей по Грамму	Набор с фуксином Циля на 100 определений с выявлением принадлежности грам + и грам -	8	5400,00	43200,00
				Итого	43 200,00

4) В 15:10, 23.01.2024 года ТОО «Nobilis SA» г.Астана, пр.Сарыарка 31/2, БЦ «ЗАПАД 2», 8 этаж, 4 офис

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
46	Шприц для забора крови	Шприц с разъемом Luer Ca2+LH 30 I.U. 3 мл 100 шт в упаковке	60	30000,00	1800000,00
59	Быстрый количественный тест на ферритин (Ferritin)	Для анализатора FIA BIOT-YG-I. Набор 25 тестов	60	60000,00	3600000,00
60	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин)	Быстрый количественный тест HbA1c (гликированный гемоглобин) Biotime-YG-I Набор 25 тестов в наборе	24	41000,00	984000,00
61	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест на D-Dimer (д димер)	Быстрый количественный тест D-Dimer (д димер) Biotime-YG-I 25 тестов в наборе	120	60000,00	7200000,00
62	Быстрый количественный тест на прокальцитонин для анализатора FIA BIOT-YG-I	Набор реактивов 25 тестов	50	63000,00	3150000,00
63	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест PSA	Быстрый количественный тест PSA (общий) Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (общий) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект	1	63000,00	63000,00
64	Biotime-YG-I Быстрый количественный тест fPSA	Быстрый количественный тест PSA (свободный) Biotime-YG-I предназначен для количественного определения концентрации PSA (свободный) в цельной крови или плазме человека на анализаторах Biotime-YG-I с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект	1	63000,00	63000,00
65	Biotime-YG-I NT-pro BNP Быстрый количественный тест	Набор реактивов 25 тестов	15	35000,00	1125000,00
				Итого	17 985 000,00

5) В 14:18, 24.01.2024 года ТОО «ЛабВесТех» г.Костанай, Бородина, 196

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
44	Азур-эозин по Романовскому	1 литр	1	4800,00	4800,00
45	Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398 - 011-29508133-2009	Используются в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40. Иммерсионное масло, помещенное между объективом и препаратом, имеет показатель преломления, равный таковому стекла. Поэтому отклоненные мельчайшими деталями объекта лучи света не рассеиваются, выходя из препарата, а попадают в объектив, без потерь рефракции. Фасовка 100 мл.	10	728,00	7280,00
				Итого	12 080,00

6) В 14:18, 24.01.2024 года ТОО «Травемедсервис» г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 191

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
41	Ренамиластин МИЧ	В упаковке флакон 10 шт .	40	32330,00	1293200,00
42	Набор реагентов «RPR-Carbon-Doc» для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR - кардиолипиновым антигеном	1000 определений	10	12325,00	123250,00
				Итого	1 416 450,00

8) В 15:15, 24.01.2024 года ТОО «ONTUSTIK MEDICAL» г.Шымкент, ул.Майты Кожа, здание 203

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
49	Тест-полоски Dirui H13-Cr	Тест полоски для анализатора Dirui H13-Cr двойное развернутый анализ мочи со 13 показателям: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, pH в количественном выражении, цвет и мутность образца, аскорбиновая кислота, а также из 2 расчетным показателям: цвет и прозрачность.	200	14157,00	2831400,00
50	Контроль мочи (отрицательный) Urinalysis Control (Negative)	3мл/бутылка	10	3485,00	34850,00
51	Контроль мочи (положительный) Urinalysis Control (Positive)	3мл /бутылка	10	3485,00	34850,00
				Итого	2 901 100,00

9) В 16:10, 24.01.2024 года ТОО «Современные медицинские технологии» г.Костанай, ул.Нарымбаевская, д.126, офис 27					
№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
1	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8x60мл+8x15мл	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксоглутарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.1. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л; Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78960,00	473760,00
2	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400 закрытого типа 8x20мл	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7Х№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; 4-нитрофенил блокированный субстрат, кинетика; жидкий биореагент. Состав: Реагент A. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.21 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/Л = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л , Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	34	214085,00	7278890,00
3	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8x60мл+8x15мл	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксоглутарат/L-аспартат; кинетика; жидкий биореагент. Состав реагента: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>400 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	78960,00	473760,00
4	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 8x60мл+8x15мл	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль, диноксульфоновая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Соляная кислота 120 ммоль/л, натриид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент B. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%, Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.8%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	34	47305,00	662270,00
5	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа(300мл)	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диноксульфоновая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент A. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроэтилтиоэтиламиноуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент B. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%, Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -	28	28275,00	791700,00

		900, фасовка 4 х 60 мл + 4 х 15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
6	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 10х60 мл	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкокиназа, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкокиназа > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л Повторяемость(CV):1.0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторяемость(CV):0.4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора BA200/BA400.	5	21880,00	109400,00
7	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 4х60мл +4х15мл	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; гликолизация, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Гликилглицин 206.25 ммоль/л; гидроксид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент В. γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 микат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 микат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 микат/л. Повторяемость (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 микат/л. Повторяемость (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка 4х 60 мл + 4х 15 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	10	89125,00	891250,00
8	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа (2х60 + 2х15)	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; ферроцин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав реагента: Тиоцианат Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В. Ферроцин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторяемость(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6% Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторяемость(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2х 60 +2х15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	45800,00	91600,00
9	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 10х60мл	ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий, почечный профиль; гидрокарбонат магний/ферроцин, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав реагента: Трис 215 ммоль/л, гидрокарбонат натрия 84 ммоль/л, железа (II) сульфат 36 ммоль/л, pH 8.4. Реагент В. Ферроцин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Предел обнаружения 23.6 мг/дл НЖС = 3.4 ммоль/л НЖС.Предел линейности: 700 мг/дл НЖС = 125 ммоль/л НЖС. Повторяемость. Средняя НЖС концентрация: 174 мг/дл = 31.2 ммоль/л. CV:2,1% n: 20%. Средняя концентрация:280 мг/дл = 50.1 ммоль/л. CV:1,5% n: 20%.Воспроизводимость: Средняя НЖС концентрация: 174 мг/дл = 31.2 ммоль/л. CV: 2.8 %. n: 25. Средняя НЖС концентрация: 280 мг/дл = 50.1 ммоль/л. CV: 2.4 %. n: 25. Количество исследований-450. Фасовка 2х 60 +2х15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	2	63280,00	126560,00
10	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл (10х60мл)	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторяемость (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора BA200/BA400.	8	40205,00	321640,00
11	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400,необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреаза >	10	88160,00	881600,00

	закрытого типа	140 Ед/мл, глицинпиперидиноксидаза > 140 Ед/мл, эмпиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 ммоль BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
12	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 закрытого типа, 160мл	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), FK-MT-7X0122.10, наличие барода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль. Биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	45	10850,00	488250,00
13	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 5x5мл	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
14	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
15	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	59140,00	591400,00
16	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400	Реакционный ротор из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакриловый термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. Роторы должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	10	50465,00	504650,00
17	Кюветы для образцов (1000) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке	24	37330,00	895920,00
18	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x15 мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	36660,00	146640,00
19	Флакон с кислотным промывочным раствором из	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический	4	38500,00	154000,00

	комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	BA200 (4x20мл). Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
20	HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x20мл)	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биореагент Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.81 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 20 мл. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	7	331525,00	2320675,00
21	LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 2x60мл+2x20мл	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биореагент Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 1.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Ед/мл, детергент, pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, pH 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	14	243155,00	3404170,00
22	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 10x60мл	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе, Общий сывороточный профиль; глицерол-фосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент Состав: PIPES 45 ммоль/л, щелочный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицерокиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, ATP 0.9 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.0 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	196705,00	590115,00
23	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400	Концентрированный промывочный раствор для автоматического биохимического анализатора BA400, 500 мл, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). РК-ИТ-7№012210	15	95630,00	1434450,00
24	ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА ДЭА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 4x60мл, 4x15мл	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль, диэтаноламинный буфер, кинетика: жидкий биореагент Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 213 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV):0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.7 %. Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл+4x15 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	4	102800,00	411200,00
25	Липаза из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1x20+1x10 мл	ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль, цветной метод, кинетика, жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Боратный буфер 50 ммоль/л, колиназа ≥ 1 мг/л, дезоксиколат 1.6 ммоль/л, хлорид кальция 10 ммоль/л, pH 8.0. Реагент В. Тартратный буфер 10 ммоль/л, 1,2-О-диэфирил-рац-глицерин-3-глутаровая кислота-(6'-метилрезоруфин)-эфир ≥ 0.3 ммоль/л, тауродезоксиколат 8.0 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики: Предел обнаружения: 4.89 ед/л = 0.08 мккат/л. . Предел количественности: 8.52	25	130100,00	3252500,00

		ед/л = 0.14мккат/л. Предел линейности: 250 ед/л = 4.17 мккат/л. Для более высоких значений разбавьте образец на 1/2 дистиллированной водой и повторите измерение. Диапазон измерения: (8.52 ед/л = 0.14 мккат/л) - (250 ед/л = 4.17 мккат/л). Точность: Средняя концентрация:52.1 ед/л = 0.86 мккат/л. Повторяемость (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.1 %. Средняя концентрация: 67.2 ед/л= 1.11 мккат/л. Повторяемость (CV): 2.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:122 ед/л = 2.03 мккат/л.Повторяемость (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Количество исследований-90. Фасовка 1x20мл+1x18мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.			
26	Лактатдегидрогеназа из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 8x60мл+8x15мл	ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). Сердечный профиль, пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л pH 7.2, Реагент В. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторяемость (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 860 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторяемость (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	1	96165,00	96165,00
27	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60 + 1x15)	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/ингибиция к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторяемость (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %. Средняя концентрация 43 мг/л. Повторяемость (CV) -1.5 %. Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	24	66715,00	1601160,00
28	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1мл	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, фасовка: 1мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	6	19235,00	115410,00
29	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, 3x1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33580,00	302220,00
30	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 3x1 мл	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400. Параметры: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка: 3x1 мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	9	33580,00	302220,00
31	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA 400 закрытого типа 10x50мл	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). РК-МТ-5М021111, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.87 ммоль/л. Повторяемость (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторяемость (CV): 0.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1400. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8°С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	3	75430,00	226290,00
32	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, необходимо наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка;	2	85375,00	170750,00

	биохимический - турбидиметрический BA400 закрытого типа 600мл	жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорфенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологические характеристики: Порговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 ммоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 ммоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 ммоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 ммоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.			
47	Картридж к iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/SE/GL 300 TEST IQM PAK	Быстро заменяемый блок с реагентами и электродами для Анализатора газов крови и электролитов GEM Premier 3000: • Габариты 216x76x152 мм, Вес 1,9 кгЕмкость: 300 тестов - 21 день на борту.Объем образца: 135 мкл (газы крови, электролиты, гематокрит); газы крови/электролиты/глюкоза/лактат/гематокрит: 145 мкл при капиллярном режиме, 150 мкл при обычном Тип образца – Цельная венепункционная кровь.	9	817100,00	7353900,00
48	Реагент контроли качества GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3500	Реагент контроли качества GEM CVP (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000. Реагенты контроля качества: для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20 ампул в упаковке	4	127375,00	509500,00
67	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60мл+1x15мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль: латекс-глобулин/гамма-глобулин, фиксированное время: жидкий реагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческим гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Порговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	5	66715,00	333575,00
68	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x3 мл)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). фасовка 1x3 мл	5	20465,00	102325,00
69	MAGLUMI HBsAg (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный комплект реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. В состав набора входит: магнитные микрочастицы, покрытые моноклональными антителами к антигену гепатита В, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %)-2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В, (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)-3 мл; буфер, содержащий БСА и NaN3 (<0,1 %)-12,5 мл; поликлональные антитела к антигену HBs вируса гепатита В, меченые ABEI; в буфере, содержащем БСА и NaN3 (<0,1 %)-22,5 мл; внутренний контроль качества, содержащий БСА, поверхностный антиген к гепатиту В (E. coli, рекомбинированный); и NaN3 (<0,1 %)- 2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. Набор на 100 исследований, температура хранения 2-8°C. Специфичность анализа HBsAg не менее 99,96 %.	80	91540,00	7322200,00
70	MAGLUMI Anti-HCV (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный MAGLUMI X3	Данный набор реагентов предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови или плазме человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора закрытого типа серии MAGLUMI. Набор содержит: магнитные микрочастицы, покрытые стрептавидином, в буфере, содержащем бычий сывороточный альбумин (БСА) и азид натрия (NaN3) (<0,1 %) – 2,5 мл; калибратор низкой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; калибратор высокой концентрации, содержащий антитела к вирусу гепатита С и NaN3 (<0,1 %) -2,5 мл; биотинилированные антигены к антигенам к ядру HCV+NS3+NS4+NS5, меченый ФИТЦ, в буфере, содержащем NaN3 (<0,1 %)-7,5 мл; поликлональные антитела к антигену меченые ABEI, в буфере, содержащем БСА и	50	137300,40	6865000,00

		NaN3 (<0,1 %)-12,5 мл; внутренний негативный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. внутренний позитивный контроль качества, содержащий антитела к вирусу гепатита С, БСА и NaN3 (<0,1 %)-2,0 мл. Все реагенты готовы к использованию. На 100 исследований. температура хранения 2-8°С. Аналитическая чувствительность <2 УЕ/мл.			
71	Стартовые реактивы 1+2 из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	25	41500,00	1037500,00
72	Промывочный концентрат 1 х 0,714 л из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора используемый для промывания ковет и дозирующих игл.	35	22280,00	779800,00
73	Реакционные модули из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI X3 (кюветы 3х182 шт)	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI представлен упаковками кювет для проведения реакции 3х182 кюветы.	37	33190,00	1228030,00
74	Раствор для проверки светового сигнала из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл.	3	36610,00	109830,00
75	Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта Автоматический хемилюминесцентный	Очищающий раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI используется для очистки трубок анализатора и предотвращения переноса реагентов при приготовлении реакционных смесей. Объем 500 мл.	1	95200,00	95200,00
				Итого	56 031 275,00

11) В 09:15, 25.01.2024 года ТОО «Алматинский Торговый Холдинг» г.Шымкент, Абайский район, квартал 189, дом 32, кв 65

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
52	Набор реагентов для определения антигена Тропонина I из комплекта Анализатор i-CHROMA II, 25 тестов	Набор реагентов и принадлежностей для количественного экспресс определения Тропонин-I в сыворотке/плазме человека. Состав набора: ID чип с данными калибровки конкретного лота, пробирки для смешивания образца с буфером для детекции, флакон с буфером, картридж. Количество тестов в наборе - 25.	60	72000,00	4320000,00
53	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I для портативного флуоресцентного анализатора i-CHROMA II	Набор реагентов и принадлежностей для проведения контроля качества теста тропонина I на анализаторе i-CHROMA II	4	28745,00	114980,00
54	Реагент А калибровочный/A calibration reagent Audicom AC9801	Реагент А калибровочный/A calibration reagent	100	59000,00	5900000,00
55	Реагент В стандартный/B standart reagent Audicom AC9801	Реагент В калибровочный/A calibration reagent	15	49000,00	735000,00
56	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent Audicom AC9801	Реагент активации электродов /Electrode activation reagent	15	29900,00	448500,00
57	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent Audicom	Реагент депротеинизации электродов/Electrode deproteinization reagent	15	29900,00	448500,00

	AC9801				
				Итого	11 965 980,00

12) В 09:35, 25.01.2024 года ТОО «Нора реактив» г.Костанай, ул.Гашека 6/1-38

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
40	Набор для определения АЧТВ	Набор для определения АЧТВ на 100 определений	27	9585,00	258795,00
				Итого	258 795,00

13) В 09:45, 25.01.2024 года ИП «Алтынбесова г.Астана, ул.Елендиева 52/1, ВП-84

№ лота	Наименование	Торговое наименование	Кол-во	Цена	Общая сумма
58	Трубка насоса Audicom AC9801	Упаковка 1 шт	3	35000,00	105000,00
				Итого	105 000,00

5. Заявка на участие в закупе по лотам №69,70,71,72,74 потенциального поставщика ТОО «Алматинский Торговый Холдинг» отклоняется в связи с несоответствием требованиям п.п. 1 пункта 11 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, правил организации и проведения закупа.
6. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, присутствовал представитель потенциального поставщика ТОО «Алматинский Торговый Холдинг» Ялдин Жандос Сабитулы.

И.о. главного врача — Шаперников В.В.

Заведующий ХДП — Алимбаев С.А.

Юрист — Залесский Н.В.