

COVID-19-ҒА ҚАРСЫ САЛЫНАТЫН ВАКЦИНА ҚАУІПТІ МЕ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вакцина инфекциялық агенттерді – ауру тудыруы мүмкін вирустарды, бактерияларды немесе басқа да микроорганизмдерді имитациялайды. Осылайша адамның иммундық жүйесі тез және тиімді жауап беруге «үйренеді».

COVID-19-ға қарсы вакцинациялау кезінде ауру тудырмайтын, бірақ, сонымен қатар, иммундық жауапты қауіпсіз генерациялайтын, инактивацияланған немесе әлсіздендірілген вирусты пайдалана отырып фрагменттер қолданылады.

ДДСҰ жаппай қолдануға рұқсат берген вакциналар ауруларға қарсы күресте олардың қауіпсіздігін және тиімділігін дәлелдеу мақсатында міндетті түрде тестілеуден және клиникалық сынақтардан өтеді, сондай-ақ ұлттық реттеуіш стандарттарына сәйкес келетіндігі тексеріледі.



 ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ ВАКЦИНАНЫ КІМ АЛУЫ ТИС?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**КОРОНАВИРУСҚА ҚАРСЫ ВАКЦИНАНЫ, ЕҢ АЛДЫМЕН,
МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚПЕН
ЖІІ АРАЛАСАТЫН ҚАУІП ТОБЫНДАҒЫ АДАМДАР АЛУЫ КЕРЕК**



**жұқпалы аурулар ауруханасының, жедел медициналық көмектің,
реанимацияның, қабылдау бөлімінің, санэпидқызметтің қызметкерлері.**

**мектеп, ЖОО, мектеп-интернат, мектепте дейінгі балалар мекемелерінің
педагогтары, студенттер және созылмалы аурулары бар адамдар**

**ТЖМ, ПМ, Қорғаныс министрлігі,
ҰҚҚ қызметкерлері**

КР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

ВАКЦИНАЦИЯЛА УДЫҢ АЛДЫНДА АНТИДЕНЕЛЕРГЕ ТЕСТ ТАПСЫРУ КЕРЕК ПЕ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Дүниежүзілік Денсаулық сақтау үйымының ұсынымдарына сәйкес, КВИ-ге қарсы вакцинациялау алдында антиденелерді анықтау **үшін ИФА зерттеуін** жүргізу қажет емес.

Аталған инфекциямен ауырған адамдарды КВИ-ге қарсы вакцинациялау аурудан **жазылғаннан кейін 6 ай өткен соң**, антиденелерге скринингсіз денсаулық жағдайын ескере отырып жүргізу ұсынылады.

Қазіргі кезде дүние жүзінде қандағы антиденелердің «қорғаныш» деңгейін көрсететін бірде-бір нормативтік құжат жоқ. Яғни, клиникалық жағынан айқындалатын ауыру қаупі жоқ. Осылай байланысты, вакцинациялау алдында антиделердің деңгейін анықтау арқылы ақпарат алуға болмайды.



КР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

COVID-19-ға қарсы вакцинация қалай жүргізіледі?

Қайда

- Тұрғылықты жері бойынша емханада/ шақырту бойынша үақытша өкпе жасау пункттерінде
- Өзіңізben бірге жеке күәлігініздің болуы қажет

Екпе алдында:

1



сізден саулнама, ерікті **ақпараттандырылған**
келісім парағын толтыруды сұрайды
сізге **вакцинациялау жүргізу тәртібі**
туралы жадынама береді



2



дәрігер/фельдшер
міндетті медициналық
қарап-тексеру жүргізеді

3



Вакцинациядан кейін:

сіз **30 минут медицина қызметкерінің**
бақылауында, содан кейін **3 күн**
учаскелік медицина қызметкерінің
бақылауында болуыңыз тиіс



сізге **вакцина алғаннан**
кейін өзіңізді нашар сезінген
жағдайда қайда қаралу керектігі
жөнінде **ақпараттық параста береді**

4

5

21
день

COVID-19-ға қарсы вакцина екі рет жүргізіледі
Бірінші вакцинациядан кейін 21 күн
өткен соң екінші екпені алу күні мен
үақыты туралы **СМС-хабарлама** келеді



Екінші вакцинациядан кейін сіз алғанған
екпе туралы мәліметтері бар –
вакцинациялау күні, вакцина атауы,
өндірісі, жарамдылық мерзімі,
сериясы дәрігердің қолы атаулы
сертификат аласыз.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

COVID-19-ға қарсы вакцинациялау туралы нені білу керек?




COVID-19-ға қарсы вакцинация ЕРІКТІ

түрде жүргізіледі. Бұл үшін заңнамалық жауапкершілік көзделмеген



Коронавирус инфекциясына қарсы вакцинация **барлығына ТЕГІН жүргізіледі**



Вакцинациялау бетпердені қолдану, қол гигиенасын, жәтелудің "этикетін" және әлеуметтік қашықтықты сақтау **қажеттілігін өзгертпейді**



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

COVID-19-ға қарсы вакцина алғаннан кейін иммунитет қашан қалыптасады?



Бірінші дозаны
салғаннан кейін
12-14 күн ішінде
бірінші иммундық
жауап қалыптасады

осы кезеңде барлық сақтық
шараларын сақтау керек:
бетперде тағу, қол
гигиенасын, жөтелү
«этикеті» және әлеуметтік
қашықтық



тұрақты иммунитет
32–45 күннен кейін,
ең көп дегендеге
56 күннен кейін
қалыптасады



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

ҰЖЫМДЫҚ ИММУНИТЕТ ДЕГЕН НЕ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ұжымдық иммунитет – бұл халықтың көпшілігі белгілі бір жүқпалы аурудың қоздырғышынан қорғалуы тиіс шекті вакцинациялаумен қамту керек.

Коронавирус инфекциясына қарсы ұжымдық иммунитетке қол жеткізу үшін еліміздегі **ересек адамдардың 60%-ын вакцинациялаумен қамту керек.** Бұл қоғамдағы вирус айналымын төмендетеді үлесін азайтады және вакцина ала алмайтын әлсіз топтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.



COVID-19 жүқтырған адамдардың жартысын да ауру орташа немесе жеңіл түрде өтетінін, ал кейбір адамдарда ешқандай симптомдардың байқалмайтынын естен шығармаған маңызды, алайда көптеген адамдар қатты ауырады және ауруханаға жатуға мүқтаж.



КР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

COVID-19-ға қарсы вакцина алғаннан кейін ауыру қаупі бар ма?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вакцинация - коронавирус инфекциясына қарсы жалғыз қорғыш шарасы, аурудың ауыр түрлерін, асқыну қаупін азайтады.



Егер сіз екпе алғаннан кейін ауруды жұқтырғанның өзінде, **ол жеңіл түрде, асқынусыз өтеді.**



Есте сақтаңыз

Симптомсыз пациенттер инфекция көзі болып табылатынын **есте сақтаңыз!** Бетперде тағуды, әлеуметтік қашықтықты, қол гигиенасын және жөтелу этикетін сақтауды жалғастырыңыз.



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

Вакцина алу үшін кем дегенде бір сағат үақыт қажет



Екпе салғаннан
кейін бақылау

Екпе алдында
дәрігер/фельдшер
қарап-тексереді



30
минут

10
минут

15
минут

Препаратты
дайындау,
мед. құжаттарды
зерделеу,
вакцинациялау,
екпені есепке алу



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ

COVID-19-ға қарсы вакцина салдыруға болмайды, егер:



18 жасқа
толмаған болсаңыз



сіз жүкті және бала
емізетін әйел
болсаңыз



сізде **медициналық**
қарсы
көрсетілімдер болса



медициналық
қарап-тексерілуден
өтпесеніз



дене қызыныңыз
37°С жоғарыласа



вакцинациялау кезінде
немесе алдыңғы
2 аптада ЖРВИ-мен
ауырған болсаңыз



сізде **жіті жүқпалы және**
жүқпалы емес
диагнозы болса



сізде **созылмалы немесе**
аллергиялық ауруларыңыз
асқынса.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
МЕДИА-ОРТАЛЫҚ