

# Рак молочной железы (/ru/2017-03-12-10-50-44/stati/2748-rak-molochnoj-zhelezy)

Опубликовано: 31.10.2023 14:29

Печать

Рак молочной железы – наиболее распространенное онкологическое заболевание в Европейском регионе ВОЗ и основная причина смертности от рака среди женщин.

По информации ВОЗ ежечасно в Европейском регионе ВОЗ рак молочной железы диагностируется у 66 женщин, и 18 умирают от него.



Женщины с симптомами рака молочной железы нуждаются в быстром и легком доступе к качественным медицинским услугам для своевременной диагностики и лечения.

Глобальная инициатива ВОЗ по борьбе с раком молочной железы (GBCI), созданная в 2021 году, объединяет заинтересованные стороны из различных секторов для снижения смертности от рака молочной железы во всем мире. В рамках GBCI реализуются три ключевые стратегии:

укрепление здоровья и ранняя диагностика

своевременная диагностика


комплексное лечение рака молочной железы.

Цель GBCI - к 2040 году ежегодно снижать смертность от рака молочной железы в мире на 2,5%, тем самым предотвратить 2,5 млн. случаев смерти от рака в мире.




Страны с высокими показателями выживаемости при раке молочной железы характеризуются более высоким уровнем охвата населения услугами здравоохранения (финансовая защита) и большим количеством государственных онкологических центров (доступность и качество медицинской помощи). Стандартизированная по

возрасту смертность от рака молочной железы за период с 1980-х гг. по 2020 г. в странах с высоким уровнем дохода сократилась на 40%.



Для улучшения исходов рака молочной железы необходимо укреплять базовые механизмы систем здравоохранения, позволяющие массово внедрять методы лечения, которые зарекомендовали свою эффективность. Это также имеет значение для ведения других онкологических и неонкологических неинфекционных заболеваний (НИЗ).

В Казахстане рак молочной железы занимает первое место в структуре злокачественных новообразований у женщин. В среднем у нас в стране ежегодно выявляется до 5000 больных раком молочной железы, умирают до 1200 женщин.



С 2011 года в Казахстане проводятся скрининговые осмотры для женщин от 40 до 70 лет по раннему выявлению рака молочной железы. При выявлении опухоли на ранних стадиях, лечение проходит успешно у 95% онкобольных.

Пройдите бесплатный скрининг в поликлиниках по месту прикрепления. Лечение всех онкологических болезней в Казахстане полностью финансируется государством в рамках ГОБМП.

В Казахстане более 10 лет проводится Национальный скрининг для женщин от 40 до 70 лет по раннему выявлению рака молочной железы. **Пройдите бесплатный скрининг в поликлиниках по месту прикрепления.**



World Health Organization  
European Region  
United Action  
Against Cancer

### Какие факторы вызывают рак молочной железы?

Чаще всего рак молочной железы встречается у женщин. На мужчин приходится 0,5–1% всех случаев рака грудной железы.

Риск развития рака молочной железы повышается при наличии ряда факторов:

зрелый возраст (старше 40 лет);

ожирение

употребление алкоголя

семейный анамнез рака молочной железы

употребление табака и гормональная терапия в период постменопаузы

На ранних стадиях заболевания большинство женщин не отмечает симптомов.

При обнаружении аномального уплотнения в груди Вам необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если уплотнение не вызывает боли.

При обнаружении аномального уплотнения в груди **необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если уплотнение не вызывает боли.**



World Health Organization  
European Region  
United Action  
Against Cancer

Берегите себя и своих близких!  
Будьте здоровы!