Анализ на инфекцию Helicobacter pylori

Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) — распространенный возбудитель инфекции желудка и двенадцатиперстной кишки.

ХЕЛИК – самый распространенный дыхательный тест на инфекцию Helicobacter pylori. Он прошел клинические испытания и рекомендован Научным обществом гастроэнтерологов. Соответствует европейским стандартам качества (CE. При соблюдении всех правил подготовки, ХЕЛИК – тест гарантирует получение достоверного и быстрого результата.

Подготовка к обследованию:

Обследование должно проводиться утром натощак:

Перед обследованием необходимо исключить прием пищи и воды. Последний прием пищи должен быть не менее чем за 12 часов до исследования. Последний прием пищи должен быть «легким», необходимо исключить такие продукты как мясо, рыбу и грибы.

Нельзя принимать:

Антибиотики в течение 4-6 недель перед обследованием

Антациды (ингибиторы протонной помпы или Р2-блокаторы), противовоспалительные средства, антисекреторные препараты, препараты висмута и анальгетики в течение 14 дней перед обследованием.

Нельзя принимать крепкие спиртные напитки в течение 3 суток перед обследованием.

Нельзя есть бобовые (фасоль, горох, чечевицу, сою) в течение 3 суток перед обследованием.

В день обследования необходимо отказаться от жевательной резинки.

Нельзя курить за 3 часа до обследования; после курения необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.

Утром перед обследованием необходимо почистить зубы и тщательно прополоскать рот.